

Hudlægen informerer om

# Dapson

I pjecen informeres om behandling med Dapson. Hvis der er spørgsmål, som ikke er besvaret, bør de stilles til hudlægen.

## Hvordan virker Dapson?

Dapson anvendes til behandling af sjældne hudsygdomme, hvor betændelsesprocesser forekommer. Midlet er beslægtet med sulfaforbindelser, der virker mod bakterier. Dapson dæmper også betændelsesprocesser, der ikke er forårsaget af bakterier.

## Hvordan tages Dapson?

Dapson tages 1 gang daglig med lidt vand.

## Dapson og anden medicin.

Trimetoprim bør kun efter aftale med lægen tages sammen med Dapson.

## Bivirkninger

Hvis dosis ikke er over 2 tabletter (100 mg) dagligt, tales Dapson godt af de fleste.

Enkelte kan få kvalme, opkastning, hovedpine, svimmelhed og søvnforstyrrelse. I sjældne tilfælde kan der forekomme udslæt og synsforstyrrelser. Hudlægen bør da kontaktes.

Dapson binder sig til de røde blodlegemer og kan hæmme iltningen. Desuden kan stoffet hos enkelte give blodmangel. Blodprøvekontrol er derfor nødvendig under behandlingen.

## Prævention, graviditet og amning

Dapson må ikke tages i forbindelse med graviditet og amning.

