

Hudlægen informerer om

Imurel® (Azathioprin)

I pjecen informeres om behandling med Imurel.

Hvis der er spørgsmål, som ikke er besvaret, bør de stilles til hudlægen.

Hvordan virker Imurel?

Imureltabletter indeholder et lægemiddel, der hedder azathioprin. Det nedsætter immunsystemets aktivitet, og nogle hudsygdomme bedres, når immunsystemet hæmmes.

Hvordan tages Imurel?

Imurel tages normalt i 2 doser dagligt.

Imurel og anden medicin.

Stoffet allopurinol, der anvendes til urinsur gigt, forstærker virkningen af Imurel og bør kun tages efter aftale med hudlægen.

Bivirkninger

Behandling med Imurel kræver et nært samarbejde med Deres hudlæge. Nogle bivirkninger mærker De selv. Det kan fx. være maveproblemer og mindre appetit. Andre bivirkninger mærker De ikke selv. Imurel kan hæmme dannelsen af blodplader samt hvide og røde blodlegemer. Derfor er det nødvendigt, at der regelmæssigt bliver taget blodprøver. Imurel kan endvidere påvirke leverfunktionen, hvorfor denne også vil blive kontrolleret.

Imurel hæmmer immunsystemet og kan give let øget risiko for infektion. Ved feber og infektionssygdomme bør De kontakte Deres læge og fortælle, at De får Imurel. Der er desuden en ganske ringe risiko for kræft, herunder hudkræft.

Prævention, graviditet og amning

Imurel må ikke indtages, hvis man er gravid eller ammer. Yngre kvinder bør derfor anvende sikker prævention i forbindelse med Imurelbehandlingen.

Imureltabletterne må ikke gives til andre.
Evt. overskydende medicin afleveres til apoteket.

